



Redes Neuronales Profundas

Backpropagation


Basado en el ppt 07 – Gradients de

Prof. Simon Prince

Adaptado por Prof. Fernando Crema García



Clasificación de los géneros musicales



- Problema de clasificación multiclase (clases discretas, >2 valores posibles)
- Red convolucional

Función de pérdida

$$\mathbf{x}_i = [x_1, x_2, x_3]^T$$

x_1
 x_2
 x_3



$$\mathbf{y}_i = [y_1, y_2]^T$$

y_1
 y_2

- Conjunto de datos de entrenamiento de I pares de ejemplos de entrada/salida:

Relaciones de orden.
a R b $i \leq j$

$$\{\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i\}_{i=1}^I$$

interpretar
↳ ℓ_1 ℓ_2
2 3

- La función de pérdida o función de coste mide lo malo que es el modelo:

$$\ell = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - f(\mathbf{x}_i))^2$$

$$L[\phi, f[\mathbf{x}_i, \phi], \{\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i\}_{i=1}^I]$$

o para abreviar:

$$L[\phi] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \hat{\mathbf{y}}$$

$$L[\phi]$$


Devuelve un escalar que es más pequeño cuando el modelo asigna mejor las entradas a las salidas

Comparar.

Linear(1,0) Ejemplo

MLP

Regresión



$$\mathbf{h}_1 = \mathbf{a}[\beta_0 + \Omega_0 \mathbf{x}]$$

$$\mathbf{h}_2 = \mathbf{a}[\beta_1 + \Omega_1 \mathbf{h}_1]$$

$$\mathbf{h}_3 = \mathbf{a}[\beta_2 + \Omega_2 \mathbf{h}_2]$$

$$\mathbf{f}[\mathbf{x}, \phi] = \beta_3 + \Omega_3 \mathbf{h}_3$$

$$\min_x \left\{ \frac{1}{n} \ell(\mathbf{x}) \right\} \approx \min_x f(\mathbf{x})$$

R.L. $\rightarrow$

Problema 1: Cómo calcular los gradientes?

$$\ell_i = (y_i - f[x_i, \phi])^2$$

Pérdida:
suma de los términos individuales

$$L[\phi] = \sum_{i=1}^I \ell_i = \sum_{i=1}^I \ell[f[\mathbf{x}_i, \phi], y_i]$$

Algoritmo SGD:

$$\frac{\nabla \ell_i}{\nabla \phi}$$

$$\phi_{t+1} \leftarrow \phi_t - \alpha \sum_{i \in \mathcal{B}_t} \frac{\partial \ell_i[\phi_t]}{\partial \phi}$$

Parámetros:

$$\mathcal{P} = \bigcup_{j=1}^{N_b} \mathcal{B}_j$$

$$\phi = \{\beta_0, \Omega_0, \beta_1, \Omega_1, \beta_2, \Omega_2, \beta_3, \Omega_3\}$$

Modelo

$$\mathcal{B}_i \cap \mathcal{B}_j = \emptyset \quad \forall i, j$$


$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_k}$$

and

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \Omega_k}$$

Necesidad de calcular gradientes

Qué son los Batches?



¿Por qué es tan importante?


- Una red neuronal no es más que una ecuación:

$$y' = \phi'_0 + \phi'_1 a[\psi_{10} + \psi_{11} a[\theta_{10} + \theta_{11} x] + \psi_{12} a[\theta_{20} + \theta_{21} x] + \psi_{13} a[\theta_{30} + \theta_{31} x]] \\ + \phi'_2 a[\psi_{20} + \psi_{21} a[\theta_{10} + \theta_{11} x] + \psi_{22} a[\theta_{20} + \theta_{21} x] + \psi_{23} a[\theta_{30} + \theta_{31} x]] \\ + \phi'_3 a[\psi_{30} + \psi_{31} a[\theta_{10} + \theta_{11} x] + \psi_{32} a[\theta_{20} + \theta_{21} x] + \psi_{33} a[\theta_{30} + \theta_{31} x]]$$

- Pero es una ecuación enorme, y necesitamos calcular la derivada
 - para cada parámetro
 - para cada punto del *batch*
 - para cada iteración de *SGD*

Problema 2: inicialización

$$\gamma \quad |\beta| = |\gamma|$$



¿Por dónde deberíamos empezar los parámetros antes de iniciar el SGD?

Gradientes

- La intuición de *backpropagation* (propagación hacia atrás de los errores)
- Modelo de juguete
- Matemáticas necesarias
- Paso adelante de *backpropagation*
- Paso hacia atrás por *backpropagation*
- Diferenciación algorítmica
- Código

Problema 1: Cómo calcular los gradientes?

Pérdida:
suma de los términos individuales

$$L[\phi] = \sum_{i=1}^I \ell_i = \sum_{i=1}^I l[f[\mathbf{x}_i, \phi], y_i]$$

Algoritmo SGD:

$$\phi_{t+1} \leftarrow \phi_t - \alpha \sum_{i \in \mathcal{B}_t} \frac{\partial \ell_i[\phi_t]}{\partial \phi}$$

Parámetros:

$$\phi = \{\beta_0, \Omega_0, \beta_1, \Omega_1, \beta_2, \Omega_2, \beta_3, \Omega_3\}$$

Necesidad de calcular gradientes

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_k} \quad \text{and} \quad \frac{\partial \ell_i}{\partial \Omega_k}$$

Algoritmo para calcular el gradiente de forma eficiente

- “Backpropagation algorithm” Rumelhart, Hinton y Williams (1986)


→ Un: Toronto

ϕ

$\Omega_1 [3, 2]$


w_{121}

Intuición BackProp nº 1: el pase hacia delante ✓



- El peso naranja multiplica la activación (salida ReLU) en la capa anterior
- • Queremos saber cómo afecta el cambio de peso de la naranja a la pérdida
- Si duplicamos la activación en la capa anterior, el peso tendrá el doble de efecto
- Conclusión: necesitamos conocer las activaciones en cada capa.


Intuición BackProp nº 2: el pase hacia atrás



Para calcular cómo un pequeño cambio en un peso o sesgo que alimenta la capa oculta $\mathbf{h}_3$ modifica la función de pérdida, necesitamos saber:

- cómo un cambio en la capa $\mathbf{h}_3$ cambia la salida del modelo $\mathbf{f}$
- cómo un cambio en el resultado del modelo modifica la pérdida l


Intuición BackProp nº 2: el pase hacia atrás



Para calcular cómo un pequeño cambio en un peso o sesgo que alimenta la capa oculta $\mathbf{h}_2$ modifica la pérdida, necesitamos saber:

- cómo afecta a $\mathbf{h}_2$ un cambio en la capa $\mathbf{h}_3$
- cómo $\mathbf{h}_3$ cambia el resultado del modelo
- cómo esta salida cambia la pérdida

Intuición BackProp nº 2: el pase hacia atrás



Para calcular cómo un pequeño cambio en un peso o sesgo que alimenta la capa oculta $\mathbf{h}_1$ modifica la pérdida, necesitamos saber:

- cómo un cambio en la capa $\mathbf{h}_1$ afecta la capa $\mathbf{h}_2$.
- cómo un cambio en la capa $\mathbf{h}_2$ afecta la capa $\mathbf{h}_3$.
- cómo la capa $\mathbf{h}_3$ modifica los resultados del modelo.
- cómo el resultado del modelo modifica la pérdida.

Gradientes

- La intuición de la retropropagación
- Modelo de juguete
- Matemáticas de base
- Paso adelante de retropropagación
- Paso hacia atrás por retropropagación
- Diferenciación algorítmica
- Código

Composición de funciones

$$f(x) = x^2 \quad \begin{matrix} x \geq 0 & \mathbb{R}^+ \end{matrix} \quad \mathbb{R}$$

Operación matemática que involucra dos funciones f, g y produce una nueva función que aplica primero g y luego f . Se denota como:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Para que la composición $f \circ g$ esté bien definida, el codominio de g debe coincidir con el dominio de f .

$$g(x) \in B \subseteq \text{dom}(f)$$

Composición de funciones

- Ejemplo $g(x) = 2x + 1$
 $f(y) = y^2$

- Entonces

$$(f \circ g)(x) = \underline{f(\underline{g(x)})} = f(2x + 1) = (\underline{2x} + 1)^2$$

$$\underline{2(2x+1) - 2} + 2(2x+1) \cdot 0$$

Derivada de $f \circ g$: regla de la cadena

- Sea la composición de funciones

$$\underbrace{h(x)} = (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

- Entonces

$$f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Derivada de $f \circ g$: Notaciones

- Todas las siguientes expresiones son equivalentes

- Sea $y = f(u)$ y $u = g(x)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

- Sea $y = f(u)$ y $u = g(x)$

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx}$$

- Sea $y = f(u)$ y $u = g(x)$ $f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Composición de funciones: Ejemplo

• Ejemplo $g(x) = 2x + 1$ $h(x) = f(g(x)) = (2x + 1)^2$
 $f(y) = y^2$

• Entonces $f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

$$\frac{df}{dy} = 2y = 2(2x + 1)$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dg}{dx} = 2$$
$$\frac{dh}{dx} = 2(2x + 1) \cdot 2 = 4(2x + 1)$$
$$\frac{d}{dx}(f(g(x))) = \frac{d}{dx}[(2x + 1)^2] = 4(2x + 1)$$

Función de juguete

$$x \in \mathbb{R}^1$$


$$f[x, \phi] = \beta_3 + \omega_3 \cos[\beta_2 + \omega_2 \exp[\beta_1 + \omega_1 \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x]]]$$

$$\phi = \{ \beta_3, \omega_3, \beta_2, \omega_2, \beta_1, \omega_1, \beta_0, \omega_0 \}$$
$$l_i = (f[x_i, \phi] - y_i)^2$$

- Consiste en una serie de funciones que se componen entre sí.
- Al contrario que en las redes neuronales sólo utiliza escalares (no vectores)
- "Funciones de activación" sen, exp, cos

$$L = \sum_{i=1}^n l_i = \sum_{i=1}^n (f[x_i, \phi] - y_i)^2$$

"Red" Neuronal



$$h_1 = \sin[\beta_0 + w_0 x]$$

$$h_2 = \exp[\beta_1 + w_1 h_1] = \exp[\beta_1 + w_1 [\sin[\beta_0 + w_0 x]]]$$

Función de juguete

$$f[x, \phi] = \beta_3 + \omega_3 \cdot \cos[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x]]]$$

$$\ell_i = (f[x_i, \phi] - y_i)^2$$

Derivadas

$$\frac{\partial \cos[z]}{\partial z} = -\sin[z] \quad \frac{\partial \exp[z]}{\partial z} = \exp[z] \quad \frac{\partial \sin[z]}{\partial z} = \cos[z]$$

Gradientes de la función juguete

$$f[x, \phi] = \beta_3 + \omega_3 \cdot \cos \left[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp \left[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x] \right] \right]$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \phi}$$

$$\ell_i = (f[x_i, \phi] - y_i)^2$$

Queremos calcular:

$$\phi = \{$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_0}, \frac{\partial \ell_i}{\partial \omega_0}, \frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_1}, \frac{\partial \ell_i}{\partial \omega_1}, \frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_2}, \frac{\partial \ell_i}{\partial \omega_2}, \frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_3}, \text{ and } \frac{\partial \ell_i}{\partial \omega_3}$$

¿Cómo puede un pequeño cambio en β_3 cambiar la pérdida ℓ_i para el i 'ésimo ejemplo?

Gradientes de funciones compuestas

$$f[x, \phi] = \beta_3 + \omega_3 \cdot \cos[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x]]]$$

$$\ell_i = (f[x_i, \phi] - y_i)^2$$

Calcular expresiones a mano:

- algunas expresiones muy complicadas.
- redundancia obvia (mira los términos sin en la ecuación inferior)

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \omega_0} = 2 \cdot (\beta_3 + \omega_3 \cdot \cos[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x_i]]] - y_i) \cdot \omega_1 \omega_3 \cdot x_i \cdot \cos[\beta_0 + \omega_0 \cdot x_i] \cdot \exp[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x_i]] \cdot \sin[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x_i]]]$$

Gradientes de funciones compuestas

$$f[x, \phi] = \beta_3 + \omega_3 \cdot \cos \left[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp \left[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x] \right] \right]$$

$$\ell_i = (f[x_i, \phi] - y_i)^2$$

Calcular expresiones a mano:

- algunas expresiones muy complicadas.
- redundancia obvia (mira los términos sin en la ecuación inferior)

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \omega_0} = -2 \left(\beta_3 + \omega_3 \cdot \cos \left[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp \left[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x_i] \right] \right] - y_i \right) \cdot \omega_1 \omega_2 \omega_3 \cdot x_i \cdot \cos[\beta_0 + \omega_0 \cdot x_i] \cdot \exp \left[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x_i] \right] \cdot \sin \left[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp \left[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x_i] \right] \right]$$

Pase hacia delante (*forward pass*)

$$f[x, \phi] = \beta_3 + \omega_3 \cdot \cos \left[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp \left[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin [\beta_0 + \omega_0 \cdot x] \right] \right]$$

$$\ell_i = (f[x_i, \phi] - y_i)^2$$

1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios
2. Calcula estas cantidades intermedias

Pase hacia delante

$$f[x, \phi] = \beta_3 + \omega_3 \cdot \cos[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x]]]$$

$$\ell_i = (f[x_i, \phi] - y_i)^2$$

1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2$$

2. Calcula estas cantidades intermedias

Pase hacia delante

$$f[x, \phi] = \beta_3 + \omega_3 \cdot \cos \left[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp \left[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin [\beta_0 + \omega_0 \cdot x] \right] \right]$$

$$\ell_i = (f[x_i, \phi] - y_i)^2$$

1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios

2. Calcula estas cantidades intermedias

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$


$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2$$



Paso atrás (*backward pass*) $\phi = \{ \beta_0, \omega_0, \beta_1, \omega_1, \dots, \omega_3, \beta_3 \}$

$$f[x, \phi] = \beta_3 + \omega_3 \cdot \cos \left[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp \left[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin [\beta_0 + \omega_0 \cdot x] \right] \right]$$

$$\ell_i = (f[x_i, \phi] - y_i)^2$$

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial f_3}, \quad \frac{\partial \ell_i}{\partial h_3}, \quad \frac{\partial \ell_i}{\partial f_2}, \quad \frac{\partial \ell_i}{\partial h_2}, \quad \frac{\partial \ell_i}{\partial f_1}, \quad \frac{\partial \ell_i}{\partial h_1}, \quad \text{and} \quad \frac{\partial \ell_i}{\partial f_0}$$


Paso atrás (*backward pass*)

$$f[x, \phi] = \beta_3 + \omega_3 \cdot \cos \left[\beta_2 + \omega_2 \cdot \exp \left[\beta_1 + \omega_1 \cdot \sin[\beta_0 + \omega_0 \cdot x] \right] \right]$$

$$l_i = (f[x_i, \phi] - y_i)^2$$

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$\frac{\partial l_i}{\partial f_3}, \quad \frac{\partial l_i}{\partial h_3}, \quad \frac{\partial l_i}{\partial f_2}, \quad \frac{\partial l_i}{\partial h_2}, \quad \frac{\partial l_i}{\partial f_1}, \quad \frac{\partial l_i}{\partial h_1}, \quad \text{and} \quad \frac{\partial l_i}{\partial f_0}$$



Backward pass

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2.$$

- La primera de estas derivadas es trivial

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} = 2 (f_3 - y_i)$$

data

$$2 (f_3 - y_i)$$

Backward pass

$$\frac{\partial f_3}{\partial h_3} = w_3$$

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2$$

- La segunda de estas derivadas se calcula mediante la regla de la cadena

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial h_3} = \frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3}$$

¿Cómo puede un pequeño cambio en h_3 cambiar ℓ_i ?

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial h_3} = \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} \frac{\partial f_3}{\partial h_3}$$

Expresiones equivalentes

Backward pass

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2.$$

- La segunda derivada se calcula mediante la regla de la cadena

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial h_3} = \frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3}$$

¿Cómo puede un pequeño cambio en h_3 cambiar ℓ_i ?

¿Cómo puede un pequeño cambio h_3 cambiar f_3 ?

$$2(f_3 - y_i) \cdot \omega_3$$

¿Cómo puede un pequeño cambio f_3 cambiar ℓ_i ?

Backward pass

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2.$$

- La segunda de estas derivadas se calcula mediante la regla de la cadena

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial h_3} = \frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3}$$

¿Cómo puede un pequeño cambio en h_3 cambiar ℓ_i ?

ω_3

Disponible en el en el primer paso del **backward pass!**

Backward pass

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2.$$

- La segunda de estas derivadas se calcula mediante la regla de la cadena

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial h_3} = \boxed{\frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3}} = \omega_3 \cdot 2(f_3 - y_i)$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial h_3} = \omega_3$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} = 2(f_3 - y_i)$$

Backward pass

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2.$$

- Que usando la notación convencional sería:

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial h_3} = \boxed{\frac{\partial \ell_i}{\partial f_3}} \boxed{\frac{\partial f_3}{\partial h_3}} = 2(f_3 - y_i) \omega_3$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} = 2(f_3 - y_i)$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial h_3} = \omega_3$$

Backward pass

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2$$

- Las derivadas restantes también se calculan utilizando la regla de la cadena

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial f_2} = \frac{\partial h_3}{\partial f_2} \left(\frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} \right)$$

Res 2.

$$- \sin(f_2) \cdot [2(f_3 - y_i) \cdot \omega_3]$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial h_3}$$

Backward pass

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$\begin{aligned}f_0 &= \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i \\h_1 &= \sin[f_0] \\f_1 &= \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1 \\h_2 &= \exp[f_1]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_2 &= \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2 \\h_3 &= \cos[f_2] \\f_3 &= \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3 \\\ell_i &= (f_3 - y_i)^2.\end{aligned}$$

- Las derivadas restantes también se calculan utilizando la regla de la cadena

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial f_2} = \frac{\partial h_3}{\partial f_2} \left(\frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} \right)$$

$$-\sin(f_2)$$

Ya está computado.

Backward pass

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2.$$

- Las derivadas restantes también se calculan utilizando la regla de la cadena

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial f_2} = \frac{\partial h_3}{\partial f_2} \left(\frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} \right)$$
$$\frac{\partial \ell_i}{\partial h_2} = \frac{\partial f_2}{\partial h_2} \left(\frac{\partial h_3}{\partial f_2} \frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} \right)$$

$$\omega_2 \cdot ($$

ImageNet. (7) (0)

Backward pass

Sigmoid

[0, 0.25]

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2.$$

tanh

-1

- Las derivadas restantes también se calculan utilizando la regla de la cadena

$$\phi = \{0, 0, 0\}$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial f_2} = \frac{\partial h_3}{\partial f_2} \left(\frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} \right)$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial h_2} = \frac{\partial f_2}{\partial h_2} \left(\frac{\partial h_3}{\partial f_2} \frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} \right)$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial f_1} = \frac{\partial h_2}{\partial f_1} \left(\frac{\partial f_2}{\partial h_2} \frac{\partial h_3}{\partial f_2} \frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} \right)$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial h_1} = \frac{\partial f_1}{\partial h_1} \left(\frac{\partial h_2}{\partial f_1} \frac{\partial f_2}{\partial h_2} \frac{\partial h_3}{\partial f_2} \frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} \right)$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial f_0} = \frac{\partial h_1}{\partial f_0} \left(\frac{\partial f_1}{\partial h_1} \frac{\partial h_2}{\partial f_1} \frac{\partial f_2}{\partial h_2} \frac{\partial h_3}{\partial f_2} \frac{\partial f_3}{\partial h_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_3} \right)$$

$$0.25 \cdot 10 = 2.5$$

Vanishing gradient problem.

Backward pass

1. Calcula las derivadas de la pérdida con respecto a estas cantidades intermedias, pero en orden inverso.

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$


$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2$$

- Las derivadas restantes también se calculan utilizando la regla de la cadena



Backward pass

2. Hallar cómo cambia la pérdida en función de los parámetros β y ω .

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2.$$

- Otra aplicación de la regla de la cadena

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \omega_k} = \frac{\partial f_k}{\partial \omega_k} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_k}$$

¿Cómo puede un pequeño cambio en ω_k cambiar ℓ_i ?

¿Cómo puede un pequeño cambio en ω_k cambiar f_k ?

¿Cómo puede un pequeño cambio en f_k cambiar ℓ_i ?

Backward pass

2. Hallar cómo cambia la pérdida en función de los parámetros β y ω .

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2$$

h_3

- Otra aplicación de la regla de la cadena

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \omega_k} = \frac{\partial f_k}{\partial \omega_k} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_k}$$

¿Cómo puede un pequeño cambio en ω_k cambiar ℓ_i ?

h_k

Ya calculado en la parte 1.

Backward pass

$$\frac{\delta f_k}{\delta \beta_k} = 1$$

2. Hallar cómo cambia la pérdida en función de los parámetros β y ω .

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$

$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$\ell_i = (f_3 - y_i)^2.$$

- Otra aplicación de la regla de la cadena
- Del mismo modo, para los parámetros β

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \omega_k} = \frac{\partial f_k}{\partial \omega_k} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_k}$$
$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_k} = \frac{\partial f_k}{\partial \beta_k} \frac{\partial \ell_i}{\partial f_k}$$

Paso atrás

2. Hallar cómo cambia la pérdida en función de los parámetros β y ω .

$$f_0 = \beta_0 + \omega_0 \cdot x_i$$

$$h_1 = \sin[f_0]$$

$$f_1 = \beta_1 + \omega_1 \cdot h_1$$


$$h_2 = \exp[f_1]$$

$$f_2 = \beta_2 + \omega_2 \cdot h_2$$

$$h_3 = \cos[f_2]$$

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 \cdot h_3$$

$$l_i = (f_3 - y_i)^2$$



Gradientes

- La intuición de la retropropagación
- Modelo de juguete
- Matemáticas de base
- Paso adelante de retropropagación
- Paso hacia atrás por retropropagación
- Diferenciación algorítmica
- Código

Próxima clase

- Cómo podemos generalizar esta idea para redes neuronales?
- Cómo escribir todo en notación matricial?
- Breve introducción a regla de la cadena para cálculo matricial
- Derivando el algoritmo para la función ReLU? (Tarea 1)

$\max \{0, x\}$

Cálculo matricial

Función escalar $f[]$ de un vector $\mathbf{a}$

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{a}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial a_1} \\ \frac{\partial f}{\partial a_2} \\ \frac{\partial f}{\partial a_3} \\ \frac{\partial f}{\partial a_4} \end{bmatrix}$$

Cálculo matricial

Función escalar $f[\cdot]$ de una matriz $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial a_{11}} & \frac{\partial f}{\partial a_{12}} & \frac{\partial f}{\partial a_{13}} \\ \frac{\partial f}{\partial a_{21}} & \frac{\partial f}{\partial a_{22}} & \frac{\partial f}{\partial a_{23}} \\ \frac{\partial f}{\partial a_{31}} & \frac{\partial f}{\partial a_{32}} & \frac{\partial f}{\partial a_{33}} \\ \frac{\partial f}{\partial a_{41}} & \frac{\partial f}{\partial a_{42}} & \frac{\partial f}{\partial a_{43}} \end{bmatrix}$$

Cálculo matricial

Función vectorial $\mathbf{f}[\cdot]$ del vector $\mathbf{a}$

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{a}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial a_1} & \frac{\partial f_2}{\partial a_1} & \frac{\partial f_3}{\partial a_1} \\ \frac{\partial f_1}{\partial a_2} & \frac{\partial f_2}{\partial a_2} & \frac{\partial f_3}{\partial a_2} \\ \frac{\partial f_1}{\partial a_3} & \frac{\partial f_2}{\partial a_3} & \frac{\partial f_3}{\partial a_3} \\ \frac{\partial f_1}{\partial a_4} & \frac{\partial f_2}{\partial a_4} & \frac{\partial f_3}{\partial a_4} \end{bmatrix}$$

Comparación de vectores y matrices

Derivadas escalares:

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 h_3 \qquad \frac{\partial f_3}{\partial h_3} = \frac{\partial}{\partial h_3} (\beta_3 + \omega_3 h_3) = \omega_3$$

Comparación de vectores y matrices

Derivadas escalares:

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 h_3$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial h_3} = \frac{\partial}{\partial h_3} (\beta_3 + \omega_3 h_3) = \omega_3$$

Derivados de la matriz:

$$\mathbf{f}_3 = \boldsymbol{\beta}_3 + \boldsymbol{\Omega}_3 \mathbf{h}_3$$

$$\frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{h}_3} (\boldsymbol{\beta}_3 + \boldsymbol{\Omega}_3 \mathbf{h}_3) = \boldsymbol{\Omega}_3^T$$

$$\beta_3 + \omega_3 h_3$$

$$\omega_3$$

Comparación de vectores y matrices

Derivadas escalares:

$$f_3 = \beta_3 + \omega_3 h_3 \qquad \frac{\partial f_3}{\partial \beta_3} = \frac{\partial}{\partial \omega_3} \beta_3 + \omega_3 h_3 = 1$$

Derivados de la matriz:

$$\mathbf{f}_3 = \boldsymbol{\beta}_3 + \boldsymbol{\Omega}_3 \mathbf{h}_3 \qquad \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \boldsymbol{\beta}_3} = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\beta}_3} (\boldsymbol{\beta}_3 + \boldsymbol{\Omega}_3 \mathbf{h}_3) = \mathbf{I}$$

Tareas para casa: (sólo keeners)

- Considera la función: $\mathbf{f} = \mathbf{B}\mathbf{a}$

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix}$$

- Se puede escribir como $f_i = \sum_j B_{ij} a_j$

- Ahora calcula:


$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{a}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial a_1} & \frac{\partial f_2}{\partial a_1} & \frac{\partial f_3}{\partial a_1} \\ \frac{\partial f_1}{\partial a_2} & \frac{\partial f_2}{\partial a_2} & \frac{\partial f_3}{\partial a_2} \\ \frac{\partial f_1}{\partial a_3} & \frac{\partial f_2}{\partial a_3} & \frac{\partial f_3}{\partial a_3} \\ \frac{\partial f_1}{\partial a_4} & \frac{\partial f_2}{\partial a_4} & \frac{\partial f_3}{\partial a_4} \end{bmatrix}$$

- Escribe la expresión final como una matriz

Gradientes

- La intuición de la retropropagación
- Modelo de juguete
- Matemáticas de base
- Paso adelante de retropropagación
- Paso hacia atrás por retropropagación
- Diferenciación algorítmica
- Código

El pase hacia delante



1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios

$$\mathbf{f}_0 = \beta_0 + \Omega_0 \mathbf{x}_i$$

$$\mathbf{h}_1 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_0]$$

$$\mathbf{f}_1 = \beta_1 + \Omega_1 \mathbf{h}_1$$

$$\mathbf{h}_2 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_1]$$


$$\mathbf{f}_2 = \beta_2 + \Omega_2 \mathbf{h}_2$$

$$\mathbf{h}_3 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_2]$$

$$\mathbf{f}_3 = \beta_3 + \Omega_3 \mathbf{h}_3$$

$$\ell_i = l[\mathbf{f}_3, y_i]$$

El pase hacia delante



1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios

$$\mathbf{f}_0 = \beta_0 + \Omega_0 \mathbf{x}_i$$

$$\mathbf{h}_1 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_0]$$

2. Calcula estas cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_1 = \beta_1 + \Omega_1 \mathbf{h}_1$$

$$\mathbf{h}_2 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_1]$$


$$\mathbf{f}_2 = \beta_2 + \Omega_2 \mathbf{h}_2$$

$$\mathbf{h}_3 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_2]$$

$$\mathbf{f}_3 = \beta_3 + \Omega_3 \mathbf{h}_3$$

$$\ell_i = l[\mathbf{f}_3, y_i]$$

El pase hacia atrás



1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios

$$\mathbf{f}_0 = \beta_0 + \Omega_0 \mathbf{x}_i$$

$$\mathbf{h}_1 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_0]$$

2. Calcula estas cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_1 = \beta_1 + \Omega_1 \mathbf{h}_1$$

$$\mathbf{h}_2 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_1]$$

3. Tomar derivadas de la producción con respecto a las cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_2 = \beta_2 + \Omega_2 \mathbf{h}_2$$

$$\mathbf{h}_3 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_2]$$

$$\mathbf{f}_3 = \beta_3 + \Omega_3 \mathbf{h}_3$$

$$\ell_i = l[\mathbf{f}_3, y_i]$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3}$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_2} = \frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3}$$


$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_1} = \frac{\partial \mathbf{h}_2}{\partial \mathbf{f}_1} \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial \mathbf{h}_2} \left(\frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3} \right)$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_0} = \frac{\partial \mathbf{h}_1}{\partial \mathbf{f}_0} \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial \mathbf{h}_1} \left(\frac{\partial \mathbf{h}_2}{\partial \mathbf{f}_1} \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial \mathbf{h}_2} \frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3} \right)$$

Gradientes

- La intuición de la retropropagación
- Modelo de juguete
- Matemáticas de fondo
- Paso adelante de retropropagación
- Paso hacia atrás por retropropagación
- Diferenciación algorítmica
- Código

El pase hacia atrás



1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios

$$\mathbf{f}_0 = \beta_0 + \Omega_0 \mathbf{x}_i$$

$$\mathbf{h}_1 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_0]$$

2. Calcula estas cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_1 = \beta_1 + \Omega_1 \mathbf{h}_1$$

$$\mathbf{h}_2 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_1]$$

3. Tomar derivadas de la producción con respecto a las cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_2 = \beta_2 + \Omega_2 \mathbf{h}_2$$

$$\mathbf{h}_3 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_2]$$

$$\mathbf{f}_3 = \beta_3 + \Omega_3 \mathbf{h}_3$$

$$\ell_i = l[\mathbf{f}_3, y_i]$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3}$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_2} = \frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \boxed{\frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3}} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3}$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_1} = \frac{\partial \mathbf{h}_2}{\partial \mathbf{f}_1} \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial \mathbf{h}_2} \left(\frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3} \right)$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_0} = \frac{\partial \mathbf{h}_1}{\partial \mathbf{f}_0} \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial \mathbf{h}_1} \left(\frac{\partial \mathbf{h}_2}{\partial \mathbf{f}_1} \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial \mathbf{h}_2} \frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3} \right)$$

¡Caramba!


- Pero...:

$$\frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{h}_3} (\boldsymbol{\beta}_3 + \boldsymbol{\Omega}_3 \mathbf{h}_3) = \boldsymbol{\Omega}_3^T$$

- Muy similar a:

$$\frac{\partial f_3}{\partial h_3} = \frac{\partial}{\partial h_3} (\beta_3 + \omega_3 h_3) = \omega_3$$

El pase hacia atrás



1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios

$$\mathbf{f}_0 = \beta_0 + \Omega_0 \mathbf{x}_i$$

$$\mathbf{h}_1 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_0]$$

2. Calcula estas cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_1 = \beta_1 + \Omega_1 \mathbf{h}_1$$

$$\mathbf{h}_2 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_1]$$

3. Tomar derivadas de la producción con respecto a las cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_2 = \beta_2 + \Omega_2 \mathbf{h}_2$$

$$\mathbf{h}_3 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_2]$$

$$\mathbf{f}_3 = \beta_3 + \Omega_3 \mathbf{h}_3$$

$$\ell_i = l[\mathbf{f}_3, y_i]$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3}$$


$$\frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{h}_3} (\beta_3 + \Omega_3 \mathbf{h}_3) = \Omega_3^T$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_2} = \frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3}$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_1} = \frac{\partial \mathbf{h}_2}{\partial \mathbf{f}_1} \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial \mathbf{h}_2} \left(\frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3} \right)$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_0} = \frac{\partial \mathbf{h}_1}{\partial \mathbf{f}_0} \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial \mathbf{h}_1} \left(\frac{\partial \mathbf{h}_2}{\partial \mathbf{f}_1} \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial \mathbf{h}_2} \frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3} \right)$$

El pase hacia atrás



1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios

$$\mathbf{f}_0 = \beta_0 + \Omega_0 \mathbf{x}_i$$

$$\mathbf{h}_1 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_0]$$

2. Calcula estas cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_1 = \beta_1 + \Omega_1 \mathbf{h}_1$$

$$\mathbf{h}_2 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_1]$$

3. Tomar derivadas de la producción con respecto a las cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_2 = \beta_2 + \Omega_2 \mathbf{h}_2$$

$$\mathbf{h}_3 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_2]$$

$$\mathbf{f}_3 = \beta_3 + \Omega_3 \mathbf{h}_3$$

$$\ell_i = l[\mathbf{f}_3, y_i]$$


$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3}$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_2} = \frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3}$$


$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_1} = \frac{\partial \mathbf{h}_2}{\partial \mathbf{f}_1} \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial \mathbf{h}_2} \left(\frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3} \right)$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_0} = \frac{\partial \mathbf{h}_1}{\partial \mathbf{f}_0} \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial \mathbf{h}_1} \left(\frac{\partial \mathbf{h}_2}{\partial \mathbf{f}_1} \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial \mathbf{h}_2} \frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3} \right)$$

Derivado de ReLU



Derivado de ReLU



$$\mathbb{I}[z > 0]$$

"Función de
indicador"

Derivado de RELU

1. Considera:

$$\mathbf{a} = \text{ReLU}[\mathbf{b}]$$

donde:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

2. Podríamos escribir
equivalentemente:

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{ReLU}[b_1] \\ \text{ReLU}[b_2] \\ \text{ReLU}[b_3] \end{bmatrix}$$


3. Tomando la derivada

$$\frac{\partial \mathbf{a}}{\partial \mathbf{b}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial a_1}{\partial b_1} & \frac{\partial a_2}{\partial b_1} & \frac{\partial a_3}{\partial b_1} \\ \frac{\partial a_1}{\partial b_2} & \frac{\partial a_2}{\partial b_2} & \frac{\partial a_3}{\partial b_2} \\ \frac{\partial a_1}{\partial b_3} & \frac{\partial a_2}{\partial b_3} & \frac{\partial a_3}{\partial b_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{I}[b_1 > 0] & 0 & 0 \\ 0 & \mathbb{I}[b_2 > 0] & 0 \\ 0 & 0 & \mathbb{I}[b_3 > 0] \end{bmatrix}$$

4. De forma equivalente, podemos multiplicar
puntualmente por la diagonal

$$\mathbb{I}[\mathbf{b} > 0] \odot$$

El pase hacia atrás



1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios

$$\mathbf{f}_0 = \beta_0 + \Omega_0 \mathbf{x}_i$$

$$\mathbf{h}_1 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_0]$$

2. Calcula estas cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_1 = \beta_1 + \Omega_1 \mathbf{h}_1$$

$$\mathbf{h}_2 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_1]$$

3. Tomar derivadas de la producción con respecto a las cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_2 = \beta_2 + \Omega_2 \mathbf{h}_2$$

$$\mathbf{h}_3 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_2]$$

$$\mathbf{f}_3 = \beta_3 + \Omega_3 \mathbf{h}_3$$

$$\ell_i = l[\mathbf{f}_3, y_i]$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3}$$


$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_2} = \frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3}$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_1} = \frac{\partial \mathbf{h}_2}{\partial \mathbf{f}_1} \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial \mathbf{h}_2} \left(\frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3} \right)$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_0} = \frac{\partial \mathbf{h}_1}{\partial \mathbf{f}_0} \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial \mathbf{h}_1} \left(\frac{\partial \mathbf{h}_2}{\partial \mathbf{f}_1} \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial \mathbf{h}_2} \frac{\partial \mathbf{h}_3}{\partial \mathbf{f}_2} \frac{\partial \mathbf{f}_3}{\partial \mathbf{h}_3} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_3} \right)$$

$$\mathbb{I}[\mathbf{f}_2 > 0]$$

El pase hacia atrás



1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios

$$\mathbf{f}_0 = \beta_0 + \Omega_0 \mathbf{x}_i$$

$$\mathbf{h}_1 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_0]$$

2. Calcula estas cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_1 = \beta_1 + \Omega_1 \mathbf{h}_1$$

$$\mathbf{h}_2 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_1]$$

3. Tomar derivadas de la producción con respecto a las cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_2 = \beta_2 + \Omega_2 \mathbf{h}_2$$


$$\mathbf{h}_3 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_2]$$

$$\mathbf{f}_3 = \beta_3 + \Omega_3 \mathbf{h}_3$$

$$\ell_i = l[\mathbf{f}_3, y_i]$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_k} &= \frac{\partial \mathbf{f}_k}{\partial \beta_k} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} \\ &= \frac{\partial}{\partial \beta_k} (\beta_k + \Omega_k \mathbf{h}_k) \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} \\ &= \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k}, \end{aligned}$$

El pase hacia atrás



1. Escribe esto como una serie de cálculos intermedios

$$\mathbf{f}_0 = \beta_0 + \Omega_0 \mathbf{x}_i$$

$$\mathbf{h}_1 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_0]$$

2. Calcula estas cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_1 = \beta_1 + \Omega_1 \mathbf{h}_1$$

$$\mathbf{h}_2 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_1]$$

3. Tomar derivadas de la producción con respecto a las cantidades intermedias

$$\mathbf{f}_2 = \beta_2 + \Omega_2 \mathbf{h}_2$$

$$\mathbf{h}_3 = \mathbf{a}[\mathbf{f}_2]$$

$$\mathbf{f}_3 = \beta_3 + \Omega_3 \mathbf{h}_3$$

$$\ell_i = l[\mathbf{f}_3, y_i]$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ell_i}{\partial \Omega_k} &= \frac{\partial \mathbf{f}_k}{\partial \Omega_k} \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} \\ &= \frac{\partial}{\partial \Omega_k} (\beta_k + \Omega_k \mathbf{h}_k) \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} \\ &= \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} \mathbf{h}_k^T \end{aligned}$$

Resumen del backprop


Forward pass: We compute and store the following quantities:

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_0 &= \boldsymbol{\beta}_0 + \boldsymbol{\Omega}_0 \mathbf{x}_i \\ \mathbf{h}_k &= \mathbf{a}[\mathbf{f}_{k-1}] & k \in \{1, 2, \dots K\} \\ \mathbf{f}_k &= \boldsymbol{\beta}_k + \boldsymbol{\Omega}_k \mathbf{h}_k. & k \in \{1, 2, \dots K\}\end{aligned}$$

Resumen del backprop

Forward pass: We compute and store the following quantities:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_0 &= \boldsymbol{\beta}_0 + \boldsymbol{\Omega}_0 \mathbf{x}_i \\ \mathbf{h}_k &= \mathbf{a}[\mathbf{f}_{k-1}] & k \in \{1, 2, \dots, K\} \\ \mathbf{f}_k &= \boldsymbol{\beta}_k + \boldsymbol{\Omega}_k \mathbf{h}_k. & k \in \{1, 2, \dots, K\} \end{aligned}$$



Resumen del backprop

Backward pass: We start with the derivative $\partial\ell_i/\partial\mathbf{f}_K$ of the loss function ℓ_i with respect to the network output $\mathbf{f}_K$ and work backward through the network:

$$\begin{aligned}\frac{\partial\ell_i}{\partial\boldsymbol{\beta}_k} &= \frac{\partial\ell_i}{\partial\mathbf{f}_k} & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \\ \frac{\partial\ell_i}{\partial\boldsymbol{\Omega}_k} &= \frac{\partial\ell_i}{\partial\mathbf{f}_k} \mathbf{h}_k^T & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \\ \frac{\partial\ell_i}{\partial\mathbf{f}_{k-1}} &= \mathbb{I}[\mathbf{f}_{k-1} > 0] \odot \left(\boldsymbol{\Omega}_k^T \frac{\partial\ell_i}{\partial\mathbf{f}_k} \right), & k \in \{K, K-1, \dots, 1\}\end{aligned}\tag{7.13}$$


where $\odot$ denotes pointwise multiplication and $\mathbb{I}[\mathbf{f}_{k-1} > 0]$ is a vector containing ones where $\mathbf{f}_{k-1}$ is greater than zero and zeros elsewhere.

Resumen del backprop

Backward pass: We start with the derivative $\partial \ell_i / \partial \mathbf{f}_K$ of the loss function ℓ_i with respect to the network output $\mathbf{f}_K$ and work backward through the network:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_k} &= \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \\ \frac{\partial \ell_i}{\partial \Omega_k} &= \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} \mathbf{h}_k^T & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \\ \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_{k-1}} &= \mathbb{I}[\mathbf{f}_{k-1} > 0] \odot \left(\Omega_k^T \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} \right), & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \end{aligned} \quad (7.13)$$

where $\odot$ denotes pointwise multiplication and $\mathbb{I}[\mathbf{f}_{k-1} > 0]$ is a vector containing ones where $\mathbf{f}_{k-1}$ is greater than zero and zeros elsewhere.




Resumen del backprop

Backward pass: We start with the derivative $\partial \ell_i / \partial \mathbf{f}_K$ of the loss function ℓ_i with respect to the network output $\mathbf{f}_K$ and work backward through the network:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_k} &= \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \\
 \frac{\partial \ell_i}{\partial \Omega_k} &= \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} \mathbf{h}_k^T & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \\
 \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_{k-1}} &= \mathbb{I}[\mathbf{f}_{k-1} > 0] \odot \left(\Omega_k^T \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} \right), & k \in \{K, K-1, \dots, 1\}
 \end{aligned} \tag{7.13}$$

where $\odot$ denotes pointwise multiplication and $\mathbb{I}[\mathbf{f}_{k-1} > 0]$ is a vector containing ones where $\mathbf{f}_{k-1}$ is greater than zero and zeros elsewhere.




Resumen del backprop

Backward pass: We start with the derivative $\partial \ell_i / \partial \mathbf{f}_K$ of the loss function ℓ_i with respect to the network output $\mathbf{f}_K$ and work backward through the network:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ell_i}{\partial \beta_k} &= \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \\ \frac{\partial \ell_i}{\partial \Omega_k} &= \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} \mathbf{h}_k^T & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \\ \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_{k-1}} &= \mathbb{I}[\mathbf{f}_{k-1} > 0] \odot \left(\Omega_k^T \frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{f}_k} \right), & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \end{aligned} \quad (7.13)$$

where $\odot$ denotes pointwise multiplication and $\mathbb{I}[\mathbf{f}_{k-1} > 0]$ is a vector containing ones where $\mathbf{f}_{k-1}$ is greater than zero and zeros elsewhere.



Resumen del backprop

Backward pass: We start with the derivative $\partial\ell_i/\partial\mathbf{f}_K$ of the loss function ℓ_i with respect to the network output $\mathbf{f}_K$ and work backward through the network:

$$\begin{aligned}\frac{\partial\ell_i}{\partial\boldsymbol{\beta}_k} &= \frac{\partial\ell_i}{\partial\mathbf{f}_k} & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \\ \frac{\partial\ell_i}{\partial\boldsymbol{\Omega}_k} &= \frac{\partial\ell_i}{\partial\mathbf{f}_k} \mathbf{h}_k^T & k \in \{K, K-1, \dots, 1\} \\ \frac{\partial\ell_i}{\partial\mathbf{f}_{k-1}} &= \mathbb{I}[\mathbf{f}_{k-1} > 0] \odot \left(\boldsymbol{\Omega}_k^T \frac{\partial\ell_i}{\partial\mathbf{f}_k} \right), & k \in \{K, K-1, \dots, 1\}\end{aligned}\tag{7.13}$$

where $\odot$ denotes pointwise multiplication and $\mathbb{I}[\mathbf{f}_{k-1} > 0]$ is a vector containing ones where $\mathbf{f}_{k-1}$ is greater than zero and zeros elsewhere. Finally, we compute the derivatives with respect to the first set of biases and weights:

$$\begin{aligned}\frac{\partial\ell_i}{\partial\boldsymbol{\beta}_0} &= \frac{\partial\ell_i}{\partial\mathbf{f}_0} \\ \frac{\partial\ell_i}{\partial\boldsymbol{\Omega}_0} &= \frac{\partial\ell_i}{\partial\mathbf{f}_0} \mathbf{x}_i^T\end{aligned}$$

Ventajas e inconvenientes

- Extremadamente eficiente
 - Las funciones ReLU sólo necesitan multiplicación de matrices y umbralización
- Memoria hambrienta - debe almacenar todas las cantidades intermedias
- Secuencial
 - puede procesar varios lotes en paralelo
 - pero las cosas se complican si todo el modelo no cabe en una sola máquina.

Gradientes

- La intuición de la retropropagación
- Modelo de juguete
- Matemáticas de fondo
- Paso adelante de retropropagación
- Paso hacia atrás por retropropagación
- Diferenciación algorítmica
- Código

Diferenciación algorítmica

- Los marcos modernos de aprendizaje profundo calculan las derivadas automáticamente
- Sólo tienes que especificar el modelo y la pérdida
- ¿Cómo? **Diferenciación algorítmica**
 - Cada componente sabe calcular su propia derivada
 - ReLU sabe cómo calcular la derivada de la salida con respecto a la entrada
 - La función lineal sabe calcular la derivada de la salida respecto a la entrada
 - La función lineal sabe calcular la derivada de la salida con respecto al parámetro
 - Se especifica el orden de los componentes
 - Puede calcular la cadena de derivadas
- Funciona con ramas siempre que siga siendo un grafo acíclico

Gradientes

- La intuición de la retropropagación
- Modelo de juguete
- Matemáticas de fondo
- Paso adelante de retropropagación
- Paso hacia atrás por retropropagación
- Diferenciación algorítmica
- Código

Código PyTorch

- Definir una red neuronal
- Inicializar params con inicialización He
- Definir la función de pérdida
- Elegir algoritmo de optimización
- Elija el ritmo de aprendizaje inicial
- Elija el calendario de aprendizaje
- Hacer algunos datos aleatorios
- Formación para 100 lotes

```
import torch, torch.nn as nn
from torch.utils.data import TensorDataset, DataLoader
from torch.optim.lr_scheduler import StepLR

# define input size, hidden layer size, output size
D_i, D_k, D_o = 10, 40, 5
# create model with two hidden layers
model = nn.Sequential(
    nn.Linear(D_i, D_k),
    nn.ReLU(),
    nn.Linear(D_k, D_k),
    nn.ReLU(),
    nn.Linear(D_k, D_o))

# He initialization of weights
def weights_init(layer_in):
    if isinstance(layer_in, nn.Linear):
        nn.init.kaiming_uniform(layer_in.weight)
        layer_in.bias.data.fill_(0.0)
model.apply(weights_init)

# choose least squares loss function
criterion = nn.MSELoss()
# construct SGD optimizer and initialize learning rate and momentum
optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr = 0.01, momentum=0.9)
# object that decreases learning rate by half every 10 epochs
scheduler = StepLR(optimizer, step_size=10, gamma=0.5)

# create 100 dummy data points and store in data loader class
x = torch.randn(100, D_i)
y = torch.randn(100, D_o)
data_loader = DataLoader(TensorDataset(x,y), batch_size=10, shuffle=True)

# loop over the dataset 100 times
for epoch in range(100):
    epoch_loss = 0.0
    # loop over batches
    for i, data in enumerate(data_loader):
        # retrieve inputs and labels for this batch
        x_batch, y_batch = data
        # zero the parameter gradients
        optimizer.zero_grad()
        # forward pass
        pred = model(x_batch)
        loss = criterion(pred, y_batch)
        # backward pass
        loss.backward()
        # SGD update
        optimizer.step()
        # update statistics
        epoch_loss += loss.item()
    # print error
    print(f'Epoch {epoch:5d}, loss {epoch_loss:.3f}')
    # tell scheduler to consider updating learning rate
    scheduler.step()
```

Código PyTorch

- Definir una red neuronal
- Inicializar params con inicialización He
- Definir la función de pérdida
- Elegir algoritmo de optimización
- Elija el ritmo de aprendizaje inicial
- Elija el calendario de aprendizaje
- Hacer algunos datos aleatorios
- Formación para 100 lotes

```
import torch, torch.nn as nn
from torch.utils.data import TensorDataset, DataLoader
from torch.optim.lr_scheduler import StepLR

# define input size, hidden layer size, output size
D_i, D_k, D_o = 10, 40, 5
# create model with two hidden layers
model = nn.Sequential(
    nn.Linear(D_i, D_k),
    nn.ReLU(),
    nn.Linear(D_k, D_k),
    nn.ReLU(),
    nn.Linear(D_k, D_o))

# He initialization of weights
def weights_init(layer_in):
    if isinstance(layer_in, nn.Linear):
        nn.init.kaiming_uniform(layer_in.weight)
        layer_in.bias.data.fill_(0.0)
model.apply(weights_init)

# choose least squares loss function
criterion = nn.MSELoss()
# construct SGD optimizer and initialize learning rate and momentum
optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr = 0.01, momentum=0.9)
# object that decreases learning rate by half every 10 epochs
scheduler = StepLR(optimizer, step_size=10, gamma=0.5)

# create 100 dummy data points and store in data loader class
x = torch.randn(100, D_i)
y = torch.randn(100, D_o)
data_loader = DataLoader(TensorDataset(x,y), batch_size=10, shuffle=True)

# loop over the dataset 100 times
for epoch in range(100):
    epoch_loss = 0.0
    # loop over batches
```

Código PyTorch

- Definir una red neuronal
- Inicializar params con inicialización He
- Definir la función de pérdida
- Elegir algoritmo de optimización
- Elija el ritmo de aprendizaje inicial
- Elija el calendario de aprendizaje
- Hacer algunos datos aleatorios
- Formación para 100 lotes

```
model.apply(weights_init)

# choose least squares loss function
criterion = nn.MSELoss()
# construct SGD optimizer and initialize learning rate and momentum
optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr = 0.01, momentum=0.9)
# object that decreases learning rate by half every 10 epochs
scheduler = StepLR(optimizer, step_size=10, gamma=0.5)

# create 100 dummy data points and store in data loader class
x = torch.randn(100, D_i)
y = torch.randn(100, D_o)
data_loader = DataLoader(TensorDataset(x,y), batch_size=10, shuffle=True)

# loop over the dataset 100 times
for epoch in range(100):
    epoch_loss = 0.0
    # loop over batches
    for i, data in enumerate(data_loader):
        # retrieve inputs and labels for this batch
        x_batch, y_batch = data
        # zero the parameter gradients
        optimizer.zero_grad()
        # forward pass
        pred = model(x_batch)
        loss = criterion(pred, y_batch)
        # backward pass
        loss.backward()
        # SGD update
        optimizer.step()
        # update statistics
        epoch_loss += loss.item()
    # print error
    print(f'Epoch {epoch:5d}, loss {epoch_loss:.3f}')
    # tell scheduler to consider updating learning rate
    scheduler.step()
```



Comentarios